


**교육 시설에서 유증상 감염자 및
잠재적으로 감염된 사람들과 접촉한 자의
점검 및 노출 시 의사결정 과정**

로스앤젤레스 카운티 공중 보건국

개정: 2021년 3월 11일

교육 시설의 *아동* 및 시설의 밀접 접촉자의
점검 및 노출 시 의사결정 과정

아동의 증상 및 바이러스 노출 점검을 위한 의사결정 경로 교육 시설 입장¹ 전




¹ 시설에서 아동의 건강 상태가 좋지 않을 경우, 아동을 격리실에 두고(감시자와 신체적 거리 두기, 야외가 이상적) 아래에 설명된 의사결정 경로를 따른다.

¹아동에게 나타나는 COVID-19 감염 가능 증상에는 열 100.4 °F 이상, 인후염, 이전에 없던 기침 (기본 기침과 다름), 설사 또는 구토가 있다. **아동의 증상이 COVID-19 감염 가능성과 일치하지 않지만 여전히 우려가 있는 경우, 의료제공자에게 진료를 받아 보기를 권장한다.**

교육 시설에서 잠재적으로 감염된 아동¹의 접촉자를 위한 의사결정 경로

¹ **잠재적으로 감염된 아동**이란 COVID-19 가능 증상과 일치하는 하나 이상의 증상을 보이는 시설의 아동을 의미한다. 증상에는 열 100.4 °F 이상, 인후염, 이전에 없던 기침 (기본 기침과 다름), 설사 또는 구토가 있다.

잠재적으로 감염된 아동의 밀접 접촉자는 잠재적으로 감염된 아동과 밀접 접촉(24시간 동안 6피트 내에서 총 15분 이상 함께 있었음) 했거나 또는 잠재적으로 감염된 아동의 체액/분비물을 직접 접촉한 아동이나 직원을 의미한다.




² 잠재적으로 감염된 아동의 밀접 접촉자를 위한 **노출 확인**은 잠재적으로 감염된 아동이 COVID-19 바이러스 진단 검사에서 양성 판정을 받음 또는 의료 서비스 제공자로부터 COVID-19 감염 진단을 받은 경우이다.

³ 확진자와 밀접 접촉한 **백신 접종자**는 다음의 기준을 충족하는 경우에 격리할 의무 및 COVID-19 검사를 받을 의무가 없습니다. (1) 백신 접종을 완료한 경우(즉, 2회 접종 COVID-19 백신을 2차 접종한 이후 2주 이상 경과 혹은 1회 접종 COVID-19 백신을 1회 접종한 이후 2주 이상 경과) 그리고 (2) 감염자와 마지막으로 접촉한 이후에 무증상을 유지하는 경우

교육 시설의 **직원** 및 시설에서 그들의 밀접 접촉자의
점검 및 노출 시 의사결정 경로

직원의 증상 및 바이러스 노출 점검을 위한 의사결정 경로 교육 시설 입장 전¹




¹ 사업체 및 고용주를 위한 CDC 중간 지침(2020년 5월)에 따르면 사업체가 성인 직원의 증상 점검에 고려해야 할 COVID-19 감염과 연관된 증상에는 열 100.4 °F 이상 또는 열감(오한, 땀), 이전에 없던 기침(기본 기침과 다름), 숨가쁨, 인후통, 근육통 또는 몸살, 설사 또는 구토, 이전에 없던 미각이나 후각의 상실이 있다. **직원의 증상이 위에 나열된 증상과 일치하지 않지만 여전히 우려가 있는 경우, 의료 서비스 제공자에게 진료를 받아 보기를 권장한다.**

² 확진자와 밀접 접촉한 **백신 접종자**는 다음의 기준을 충족하는 경우에 격리 및 COVID-19 검사를 받을 의무가 없습니다. (1) 백신 접종을 완료한 경우(즉, 2회 접종 COVID-19 백신을 2차 접종한 후 2주 이상 경과 혹은 1회 접종 COVID-19 백신을 1회 접종한 후 2주 이상 경과) 그리고 (2) 감염자와 마지막으로 접촉한 이후에 무증상을 유지하는 경우

교육 시설에서 잠재적으로 감염된 직원¹의 접촉자를 위한 의사결정 경로

¹ **잠재적으로 감염된 직원**이란 COVID-19 가능 증상과 일치하는 하나 이상의 증상을 보이는 시설의 직원을 의미한다. 증상에는 열 100.4 °F 이상 또는 열감(오한, 땀), 이전에 없던 기침(기본 기침과 다름), 숨 가쁨, 인후염, 근육통 또는 몸살, 설사 또는 구토, 이전에 없던 미각이나 후각의 상실이 있다.

잠재적으로 감염된 직원의 밀접 접촉자는 잠재적으로 감염된 직원과 밀접 접촉(24시간 동안 6피트 내에서 총 15분 이상 함께 있었음) 했거나, 또는 잠재적으로 감염된 직원의 체액/분비물을 직접 접촉한 아동이나 직원을 의미한다.



² 잠재적으로 감염된 직원의 밀접 접촉자를 위한 **노출 확인**은 잠재적으로 감염된 직원이 COVID-19 바이러스 진단 검사에서 양성 판정을 받음 또는 의료 서비스 제공자로부터 COVID-19 감염 진단을 받은 경우이다.

³ 확진자와 밀접 접촉한 **백신 접종자**는 다음의 기준을 충족하는 경우에 격리 및 COVID-19 테스트를 받을 의무가 없습니다. (1) 백신 접종을 완료한 경우(즉, 2회 접종 COVID-19 백신을 2차 접종한 후 2주 이상 경과 혹은 1회 접종 COVID-19 백신을 1회 접종한 후 2주 이상 경과) 그리고 (2) 감염자와 마지막으로 접촉한 이후에 무증상을 유지하는 경우

교육 시설에서

COVID-19 감염 실험실 확진 아동 또는 직원 및

시설에서 그들의 밀접 접촉자를 위한 의사결정 과정

교육 시설에서 COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 아동 또는 직원을 위한 지침

교육 시설은 COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 아동 또는 직원이 있다는 공지를 받는다.

COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 아동 또는 직원을 집으로 보낸다.

COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 아동 또는 직원에게 집에서 고립하고 다른 사람들과 떨어져 지내라고 지시한다¹.


시설은 COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 아동 또는 직원이 감염성이 있는 동안² 접촉한 접촉자들을 식별하고 접촉자들에게 노출 사실을 공지한다.

¹ COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 자는 해열제를 복용하지 않고 열이 없이 24시간, 증상 회복, 및 증상 발병 후 10일 (또는 증상이 없는 경우 진단 검사 후 10일)까지 집에서 고립한다.

² 감염자가 전염시킬 수 있는 기간은 증상 발생 48시간 전(증상이 없으면 검사일 기준)부터 감염자가 더 이상 고립하지 않아도 될 때 까지이다.

교육 시설에서 COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 아동 또는 직원에 노출된 접촉자¹를 위한 의사결정 경로

시설에서 ¹ COVID-19 감염 실험실 확진을 받은 아동이나 직원의 밀접 접촉자는 COVID-19 감염자와 24시간 동안 6피트 내에서 총 15분 이상 함께 있거나, COVID-19 감염자의 체액/분비물을 비보호 상태에서 직접 접촉한 아동이나 직원을 의미한다.



² 확진자와 밀접 접촉한 **백신 접종자**는 다음의 기준을 충족하는 경우에 격리 및 COVID-19 검사를 받을 의무가 없습니다. (1) 백신 접종을 완료한 경우(즉, 2회 접종 COVID-19 백신을 2차 접종한 이후 2주 이상 경과 혹은 1회 접종 COVID-19 백신을 1회 접종한 이후 2주 이상 경과) 그리고 (2) 감염자와 마지막으로 접촉한 이후에 무증상을 유지하는 경우