

کووید-19 میوکاردیت و پریکاردیت




میوکاردیت التهاب ماهیچه قلب است. پریکاردیت التهاب جداره خارجی قلب است.

- هر دو عارضه بر اثر واکنش طبیعی بدن به یک عفونت یا عامل تحریک کننده دیگری ایجاد می شوند. علل رایج شامل عفونت های باکتریایی و ویروسی و عوارض پزشکی از قبیل بیماری های خود ایمنی هستند. ابتلا به کووید-19 و واکسن ها می توانند سبب این عوارض قلبی شوند.
- علائم می توانند شامل درد قفسه سینه، تنگی نفس، احساس ضریان سریع، لرزش، یا تپش قلب، احساس ضعف یا خستگی شدید، و از دست دادن اشتها باشند.

میوکاردیت، پریکاردیت، و واکسن های کووید-19

- بسیار به ندرت، افراد پس از دریافت یک واکسن فایزر (Pfizer)، مدرنا (Moderna)، یا نوواواکس (Novavax) دچار میوکاردیت یا پریکاردیت می شوند.
- عوارض معمولاً چند روز پس از دریافت واکسن آغاز می شوند. اغلب افراد با دارو و استراحت، به سرعت احساس بهتری می کنند.
- نوجوانان و جوانان مذکر بیشترین احتمال را برای دچار شدن دارند. صبر کردن بین دوز اول و دوم واکسن به مدت 8 هفته، خطر را کاهش می دهد.



خطرات متوجه قلب از طریق دریافت واکسن کووید-19 بسیار پایین تر از خطرات به سبب ابتلا به کووید-19 است.

- واکسن های کووید-19 و ابتلا به کووید-19، هر دو می توانند خطر میوکاردیت و پریکاردیت را افزایش دهند. اما ابتلا به کووید-19 می تواند خطر عوارض قلبی دیگر مانند سیندروم حاد انسداد شریان قلب، سکته قلبی (آنفارکتوس)، نارسائی قلبی، و ضریان نامنظم قلب (آریتمی) را نیز افزایش دهد.
- برای اطلاعات بیشتر، با پزشک خود صحبت کنید، یا از صفحه تارنمای CDC: [میوکاردیت و پریکاردیت پس از واکسیناسیون mRNA کووید-19](#) دیدن کنید.