



# COVID-19 ワクチン – よくある質問

## ブースター接種

本書、およびその他のワクチンに関するよくある質問をオンラインで表示するには、[COVID-19 ワクチンのウェブページ](#)をご覧ください。

### COVID-19ワクチンのブースター接種はどのような人に推奨されますか？

アメリカ疾病予防管理センター（CDC）は、COVID-19 に対する最大の保護を得るために、12 歳以上のすべての人にブースター接種を受けることを推奨しています。さらに、重症化のリスクの高い人は、2 回目のブースター接種を受けることもできます。（以下の [2 回目のブースター接種を受けることのできる人とは？](#) を参照のこと）。現在、ブースター接種は 5～11 歳の子供には承認されていません。

COVID-19 ワクチンのブースター接種を受けることは、免疫機能を強化するため重要です。これにより、重症化、入院、さらには死亡したりすることを防ぎます。

### ブースター接種の対象者となるのはいつですか？

- 12歳以上の場合、ブースター接種の対象者となります。
  - Johnson & Johnson（J&J）ワクチンの単回接種から2か月後、または
  - ModernaまたはPfizerワクチンの2回目の接種から5か月後。ブースター接種には、いずれのCOVID-19ワクチンも使用できますが、PfizerまたはModerna製のワクチンが推奨されます。12～17歳の子供は、Pfizerワクチンのみブースター接種に使用できます。
- 中等度または重度の免疫不全症の方は、ブースター接種をより早く受ける必要があります。詳細については、CDCの「[中等度または重度の免疫不全症の方へのCOVID-19ワクチン接種](#)」をご覧ください。
- 米国外でワクチン接種を受けた場合は、CDCの[米国外でワクチン接種を受けた方向け COVID-19 ワクチン接種](#)のウェブページを参照し、ご自身が対象者となるかどうかを確認してください。

### どのような人が2回目のブースター接種の対象者となりますか？

以下の方々は、最初のブースター接種から4か月以上が経過している場合、2回目のCOVID-19ブースターを受ける対象となります。

- 50歳以上の方
- 18～49歳で、プライマリー接種とブースター接種の両方でJ&Jワクチンの接種を受けた方
- 12歳以上で[中等度または重度の免疫不全症の方](#)

2回目のブースター接種を受ける必要性について質問がある場合は、かかりつけ医にご相談ください。

### 2回目のブースター接種はいつ受けるべきですか？

上記の2回目のブースター接種を受けることのできるグループの1つに該当する場合は、今すぐ接種を受けるか、受けずにいるかを選択できます。ご自身の状況および接種のリスクとベネフィットを考慮してください。どのような選択をするかを検討する際に、かかりつけ医に相談することもできます。今のところ、[現時点で接種可能なCOVID-19ワクチン接種を完了しているとみなされる](#)ために2回目のブースター接種を受ける必要はありません。

特定の要因により、COVID-19で重症化する可能性が高くなります。あなたが2回目のブースター接種の対象となる場合、ご自身（またはあなたの同居者の方）が、以下に該当する場合、[直ちにブースター接種を受けることが役立ちます](#)。

- 中等度または重度の免疫不全症である
- [COVID-19で重症化する可能性が高い](#)
- 職場、居住地、またはその他の要因（頻繁に旅行したり、大規模な集会に参加したりするなど）



## COVID-19 ワクチン – よくある質問 ブースター接種

を通じて、COVID-19にさらされる可能性が高い

- COVID-19の蔓延レベルがかなり高い、または高い地域にいる
- 同居者がワクチン未接種である

以下の場合、2回目のブースター接種を待つことも検討できます。

- 過去3か月以内にCOVID-19に感染した
- 健康で、他の人との接触が限られている

詳細については、CDCの「[2回目のCOVID-19ワクチンブースター接種を受ける](#)」のウェブページをご覧ください。質問がある場合は医師に相談してください。

### ブースター接種を受けることによるリスクは何ですか？

ブースター接種を受けた後の反応は、プライマリ接種後の反応と似ています。ほとんどの副反応は軽度から中等度で、2日以内には治まります。プライマリ接種同様、深刻な副反応が起こることは稀です。詳細は、CDCの[COVID-19ワクチンの安全性](#)のウェブページをご覧ください。ブースター接種を受けることのベネフィットは、既知の潜在的なリスクを上回ります。

### ブースター接種を受けるには、医師からの手紙や処方箋を提示する必要がありますか？

いいえ、ブースター接種を受けるために医師からの手紙や処方箋は必要ありません。対象者となる場合は、自己証明（自己報告）することができます。接種場所に行く際に、CDCのホワイトカードやデジタル予防接種記録などのワクチン接種の証明を持参しましょう。詳細は、公衆衛生局の[ワクチン接種を受ける方法](#)のウェブページをご覧ください。

### 詳細情報はどこで入手できますか？



- この「よくある質問(FAQ)」または他のCOVID-19ワクチン関連項目に関するよくある質問(FAQ)を印刷または表示するには、QRコードをスキャンするか、[COVID-19 ワクチンに関するよくある質問](#)にアクセスしてください。
- CDCのウェブページ [COVID-19ワクチンのブースター接種](#)
- [VaccinateLACounty.com](#) – 接種時期を示す図表付 [COVID-19 ワクチン接種のスケジュール](#)及び[ワクチン接種を受ける方法](#)を含む。
- 質問がある場合は医師に相談してください。