



# COVID-19 백신 - 자주 묻는 질문

## 부스터샷 접종

이러한 백신 관련 자주 묻는 질문(FAQ)을 온라인으로 보려면 [COVID-19 백신 웹페이지](#)를 방문하십시오.

### COVID-19 백신 부스터샷 접종은 누구에게 권장되니까?

미국 질병통제 예방센터(CDC)는 COVID-19 으로부터 최대의 보호 효과를 얻기 위한 방법으로 만 12 세 이상 모든 사람에게 부스터샷 접종을 권장합니다. 또한, 고위험군에 해당되는 일부 사람들은 2 차 부스터샷 접종을 선택할 수 있습니다. (아래의 [2차 부스터샷 접종 받을 수 있는 사람은 누구입니까?](#)의 질문 참고). 부스터샷 접종은 현재 만 5-11 세 어린이에게는 허용되지 않습니다.

COVID-19 백신 부스터샷 접종을 받는 것은 면역력을 강화하기 때문에 중요합니다. 부스터샷 접종이 중병을 앓거나, 입원, 심지어 사망까지 방지할 수 있도록 한층 더 보호해 줍니다.

### 저는 부스터샷 접종 대상자입니까?

- 만 12세 이상인 경우, 다음의 시기에 부스터샷 접종 대상자가 됩니다:
  - 존슨앤드존슨(J&J) 백신의 1회 접종 후 2개월이 경과한 뒤 또는
  - 모더나 또는 화이자 백신의 2차 접종 후 5개월이 경과한 뒤 또는
 부스터샷은 어떤 종류의 COVID-19 백신으로도 접종 받을 수 있지만, 화이자 또는 모더나 백신이 선호됩니다. 만 12-17세 어린이는 부스터샷으로 화이자 백신만 접종 받을 수 있습니다.
- 중등도 또는 위중증의 면역력 저하 상태인 사람은 더욱 빨리 부스터샷 접종을 받아야 합니다. 자세한 내용은 CDC 웹페이지의 [중등도 또는 위중증 면역 부전자를 위한 COVID-19 백신](#)을 참고하십시오.
- 미국 외 지역에서 백신은 접종한 사람은 부스터샷 접종 시기를 알아보기 위해서 CDC 웹페이지의 [미국 외 지역에서 COVID-19 백신을 접종한 사람](#)을 참고하십시오.

### 2 차 부스터샷을 접종받을 수 있는 사람은 누구입니까?

COVID-19 1차 부스터샷 접종 후 최소 4개월이 경과했다면, 다음의 사람은 2차 부스터샷 접종 대상자가 됩니다.

- 만 65세 이상 고령자
- 만 18-49 세 성인이며, J&J 기본 백신 및 J&J 부스터샷을 접종 받은 사람
- 만 12 세 이상이며, [중등도 또는 위중증의 면역 부전자](#)

2 차 부스터샷 접종 여부에 관해 질문이 있으시면 담당 의사에게 문의하십시오.

### 저는 언제 두 번째 부스터샷을 접종 받을 수 있나요?

2차 부스터샷 접종 대상 그룹에 해당된다면, 지금 당장 부스터샷 접종을 받거나 기다렸다가 접종을 받을 수 있는 선택권이 있습니다. 자신의 상황과 위험성 그리고 이점을 고려해 보십시오. 귀하가 선택하실 수 있는 방법에 대해 담당 의사의 도움을 받으십시오. 현재 COVID-19 백신 접종을 [최신](#) 상태로 간주되기 위해서 2차 부스터샷 접종을 받으실 필요는 없습니다.

특정 요인으로 인해 COVID-19에 감염되면 중증 질환으로 발전할 수 있습니다. 여러분 (또는 함께 동거하는 사람이) 다음에 해당되고, 2차 부스터샷 접종 대상자인 경우 지금 당장 접종 받는 것이 도움이 될 수 있습니다:

- 중등도 또는 중증의 면역 부전자
- [COVID-19에 감염되면 중증 질환으로 발전할 가능성이 높은 고위험군](#)
- 직장, 거주지 또는 다른 요인(자주 여행하거나 대규모 모임에 참가하는 경우)으로 인해 COVID-





# COVID-19 백신 - 자주 묻는 질문

## 부스터샷 접종

19에 노출될 가능성이 높은 사람

- COVID-19 전파 위험도가 상당히 높은 지역에 있는 사람
- 함께 동거하는 사람이 백신을 접종하지 않은 경우

다음에 해당되면 2차 부스터샷 접종은 잠시 미루는 것을 고려해 볼 수 있습니다.

- 지난 3개월 내에 COVID-19에 감염된 경우
- 건강하고 다른 사람에게 감염을 옮길 수 있는 기회가 제한된 경우

자세한 내용은 CDC 웹사이트의 [COVID-19 백신 2차 부스터샷 접종하기](#)를 참고하십시오. 질문이 있으시면 담당 의사와 상담하십시오.

### 부스터샷 접종에 따른 위험에는 무엇이 있습니까?

부스터샷 접종 후에 반응은 기본 백신의 접종 후 반응과 유사합니다. 대부분의 부작용은 경미하거나 중등도이며 2일 이내로 지속됩니다. 기본 백신으로 인한 심각한 부작용은 매우 드뭅니다. 자세한 내용은 CDC 웹사이트의 [COVID-19 백신 안전성](#)을 방문하십시오. 부스터샷接种의 이득이 우리에게 알려진 위험성 및 잠재적 위험성보다 큽니다.

### 부스터샷을 접종 받으려면 의사의 진단서나 처방전을 제시해야 합니까?

아닙니다. 부스터샷 접종을 위한 의사의 진단서나 처방전이 필요 없습니다. 접종 자격 대상일 경우 자기 증명(자기 보고)을 할 수 있습니다. 접종소에 방문할 때 CDC 백색 카드 또는 전자 백신 접종 기록과 같은 백신 접종 증명서를 지참하십시오. 자세한 정보는 공중 보건국의 [백신 접종을 받는 방법](#) 웹페이지를 방문하십시오.

### 더 많은 정보를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?



- 본 FAQ 또는 다른 COVID-19 백신 주제에 대한 FAQ를 인쇄하거나 보려면 QR 코드를 스캔하거나 [COVID-19 백신 FAQ](#)를 방문하십시오.
- CDC 웹사이트 [COVID-19 백신 부스터샷 접종](#)
- [VaccinateLACounty.com](#) - 각 백신의 접종 기한을 보여주는 그래프와 [백신 접종 방법](#)에 대한 정보를 제공하는 [COVID-19 백신 일정](#) 포함.
- 질문이 있으시면 담당 의사와 상담하십시오.