



若需在线查看这些和其他的疫苗常见问题(FAQ)，请访问[COVID-19疫苗网页](#)。

建议哪些群体接种COVID-19疫苗的加强剂？

美国疾病控制与预防中心(CDC)建议，所有 12 岁及以上的个人都应接种加强剂，以获得最佳的 COVID-19 防护效果。此外，一些风险更高的人可以选择接种第二剂加强剂。（请参阅以下“[谁可以接种第二剂加强剂疫苗？](#)”部分）。目前，尚未批准 5-11 岁的儿童接种加强剂疫苗。

接种 COVID-19 加强剂疫苗很重要，因为它可以增强你的免疫力。接种加强剂疫苗能更好地保护你免于罹患重病、住院甚至死亡。

我什么时候有资格接种加强剂？

- 如果你在12岁或以上，在满足以下任一条件后，你将有资格接种加强剂疫苗：
 - 在接种单剂强生(J&J)疫苗的2个月后，或
 - 在接种第二剂莫德纳或辉瑞疫苗的5个月后。
- 加强剂可以是任意一种COVID-19疫苗，但应首选辉瑞或莫德纳疫苗。12-17岁的儿童只能接种辉瑞的加强剂疫苗。
- 如果你有中度或严重的免疫功能受损，你应该更早接种加强剂疫苗。请参阅CDC的网页：[“适用于中度或重度免疫功能受损群体的COVID-19疫苗”](#)，了解更多信息。
 - 如果你在美国以外的国家/地区接种了其他的COVID-19疫苗系列，请参阅CDC的网页“[适用于在美国境外接种疫苗者的COVID-19疫苗](#)”，以了解你什么时候有资格接种加强剂疫苗。

谁可以接种第二剂加强剂疫苗？

以下人群在接种了第一剂加强剂疫苗的至少4个月后，有资格接种第二剂COVID-19疫苗加强剂：

- 年龄在50岁或以上
- 年龄在 18-49 岁之间，已接种了强生疫苗的初始剂量和强生疫苗的加强剂量
- 年龄在 12 岁或以上，且[免疫功能中度或重度受损](#)

如果你有关于是否应该接种第二剂加强剂疫苗的任何问题，请咨询你的医生。

我应该在什么时候接种第二剂加强剂疫苗？

如果你属于可以接种第二剂加强剂的人群，你可以选择立即接种或等待一段时间后再接种。请基于你的情况、风险和好处，考虑何时接种疫苗。你的医生可以帮助你评估你的选项。目前，你不需要接种第二剂加强剂疫苗，就可以被视为已满足[最新的](#)COVID-19疫苗接种要求。

某些特定因素会使你更有可能因COVID-19而罹患重病。如果你满足接种第二剂加强剂疫苗的条件，并且如果你（或如果和你住在一起的人）有以下任一情况，*现在*接种可能会有所帮助：

- 中度或重度免疫功能受损
- [更有可能因COVID-19而罹患重病](#)
- 更有可能通过工作、居住地点或其他因素（如经常旅行或参加大型聚会）而接触COVID-19
- 处于COVID-19传播率相当高或很高的地区
- 如果和你住在一起的人没有接种疫苗



COVID-19 疫苗 —— 常见问题(FAQ)

加强剂

如果你属于以下任一情况，你可以考虑等待一段时间后再接种第二剂加强剂疫苗：

- 在过去3个月内感染过COVID-19
- 身体健康，并且与他人的接触有限

有关更多信息，请参阅CDC网页：“[接种COVID-19疫苗的第二剂加强剂](#)”。如果你有问题，请咨询你的医生。

接种加强剂疫苗有哪些风险？

接种加强剂疫苗后的反应和接种初始剂量疫苗后的反应一样。大多数副作用是轻到中度的，且仅会持续2天或更短的时间。与接种初始剂量后一样，严重副作用很罕见。有关详细信息，请访问CDC网页：“[COVID-19疫苗的安全性](#)”。接种加强剂疫苗的好处超过了任何已知的和潜在的风险。

我是否需要出示医生的证明或处方才能接种加强剂疫苗？

不，你不需要出示医生的证明或处方来接种加强剂疫苗。如果你符合接种要求，你可以自我证明（自我报告）。前往接种点时，请携带疫苗接种证明，如CDC的白色卡或电子版疫苗接种记录。请访问公共卫生局的“[如何接种疫苗](#)”网页，了解更多信息。

我在哪里可以获得更多信息？



- 如需打印或查看本常见问题或其他关于COVID-19疫苗主题的常见问题，请扫描二维码或访问[COVID-19疫苗常见问题\(FAQ\)](#)。
- CDC 网页：“[COVID-19疫苗的加强剂量](#)”
- [VaccinateLACounty.com](#) – 包括 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，其中有显示每一剂疫苗接种时间的图表，以及[如何接种疫苗](#)的信息。
- 如果你有任何问题，请咨询你的医生。