



若需線上查看這些和其他的疫苗常見問題(FAQ)，請訪問[COVID-19疫苗網頁](#)。

### 建議哪些群體接種COVID-19疫苗的加強劑？

美國疾病控制與預防中心(CDC)建議，所有 12 歲及以上的個人都應接種加強劑，以獲得最佳的 COVID-19 防護效果。此外，一些風險更高的個人可以選擇接種第二劑加強劑。（請參閱以下「[誰可以接種第二劑加強劑疫苗？](#)」部分）。目前，尚未批准 5-11 歲的兒童接種加強劑疫苗。

接種 COVID-19 加強劑疫苗很重要，因為它可以增強你的免疫力。接種加強劑疫苗能更好地保護你免於罹患重病、住院甚至死亡。

### 我什麼時候有資格接種加強劑？

- 如果你在12歲或以上，在滿足以下任一條件後，你將有資格接種加強劑疫苗：
  - 在接種單劑強生(J&J)疫苗的2個月後，或
  - 在接種第二劑莫德納或輝瑞疫苗的5個月後。加強劑可以是任意一種COVID-19疫苗，但應首選輝瑞或莫德納疫苗。12-17歲的兒童只能接種輝瑞的加強劑疫苗。
- 如果你有中度或嚴重的免疫功能受損，你應該更早接種加強劑疫苗。請參閱CDC的網頁：[「適用於中度或重度免疫功能受損群體的COVID-19疫苗」](#)，瞭解更多資訊。
- 如果你在美國以外的國家/地區接種了其他的COVID-19疫苗系列，請參閱CDC的網頁「[適用於在美國境外接種疫苗者的COVID-19疫苗](#)」，以瞭解你什麼時候有資格接種加強劑疫苗。

### 誰可以接種第二劑加強劑疫苗？

以下人群在接種了第一劑加強劑疫苗的至少4個月後，有資格接種第二劑COVID-19疫苗加強劑：

- 年齡在50歲或以上
- 年齡在 18-49 歲之間，已接種了強生疫苗的初始劑量和強生疫苗的加強劑量
- 年齡在 12 歲或以上，且[免疫功能中度或重度受損](#)

如果你有關於是否應該接種第二劑加強劑疫苗的任何問題，請諮詢你的醫生。

### 我應該在什麼時候接種第二劑加強劑疫苗？

如果你屬於可以接種第二劑加強劑的人群，你可以選擇立即接種或等待一段時間後再接種。請基於你的情況、風險和好處，考慮何時接種疫苗。你的醫生可以幫助你評估你的選項。目前，你不需要接種第二劑加強劑疫苗，就可以被視為已滿足[最新的](#)COVID-19疫苗接種要求。

某些特定因素會使你更有可能因COVID-19而罹患重病。如果你滿足接種第二劑加強劑疫苗的條件，並且如果你（或如果你和你住在一起的人）有以下任一情況，*現在*接種可能會有所幫助：

- 中度或重度免疫功能受損
- [更有可能因COVID-19而罹患重病](#)
- 更有可能透過工作、居住地點或其他因素（如經常旅行或參加大型聚會）而接觸COVID-19
- 處於COVID-19傳播率相當高或很高的地區



## COVID-19 疫苗 —— 常見問題(FAQ)

### 加強劑

- 如果和你住在一起的人沒有接種疫苗

如果你屬於以下任一情況，你可以考慮等待一段時間後再接種第二劑加強劑疫苗：

- 在過去3個月內感染過COVID-19
- 身體健康，並且與他人的接觸有限

有關更多資訊，請參閱CDC網頁：「[接種COVID-19疫苗的第二劑加強劑](#)」。如果你有問題，請諮詢你的醫生。

### 接種加強劑疫苗有哪些風險？

接種加強劑疫苗後的反應和接種初始劑量疫苗後的反應一樣。大多數副作用是輕到中度的，且僅會持續2天或更短的時間。與接種初始劑量後一樣，嚴重副作用很罕見。有關詳細資訊，請訪問CDC網頁：「[COVID-19疫苗的安全性](#)」。接種加強劑疫苗的好處超過了任何已知的和潛在的風險。

### 我是否需要出示醫生的證明或處方才能接種加強劑疫苗？

不，你不需要出示醫生的證明或處方來接種加強劑疫苗。如果你符合接種要求，你可以自我證明（自我報告）。前往接種點時，請攜帶疫苗接種證明，如CDC的白色卡或電子版疫苗接種記錄。請訪問公共衛生局的「[如何接種疫苗](#)」網頁，瞭解更多資訊。

### 我在哪裡可以獲得更多的資訊？



- 如需列印或查看本常見問題或其他關於COVID-19疫苗主題的常見問題，請掃描QR碼或訪問[COVID-19疫苗常見問題\(FAQ\)](#)。
- CDC 網頁：「[COVID-19疫苗的加強劑量](#)」
- [VaccinateLACounty.com](#) – 包括 [COVID-19 疫苗接種時間表](#)，其中有顯示每一劑疫苗接種時間的圖表，以及[如何接種疫苗](#)的信息。
- 如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。