



Vắc-xin COVID-19 - Câu Hỏi Thường Gặp

LIỀU TĂNG CƯỜNG

Để xem qua mạng những câu hỏi này và các câu hỏi thường gặp khác về vắc-xin, hãy truy cập [trang thông tin về vắc-xin COVID-19](#).

Các liều tăng cường cho vắc-xin COVID-19 được khuyến nghị cho những ai?

CDC khuyến nghị tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên cần chích liều tăng cường để được bảo vệ tốt nhất trước COVID-19. Ngoài ra, một số người có nguy cơ cao hơn có thể lựa chọn chích liều tăng cường thứ hai. (Xem [Những ai có thể được chích liều tăng cường thứ hai?](#) bên dưới). Hiện tại, liều tăng cường chưa được cho phép chích ngừa cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Chích liều vắc-xin COVID-19 tăng cường rất quan trọng vì giúp củng cố khả năng miễn dịch của quý vị. Liều tăng cường cung cấp cho quý vị sự bảo vệ tốt hơn, ngăn quý vị không bị bệnh nặng dẫn đến phải nhập viện, thậm chí là tử vong.

Khi nào tôi hội đủ điều kiện để được chích liều tăng cường?

- Nếu quý vị từ 12 tuổi trở lên, quý vị hội đủ điều kiện được chích liều tăng cường:
 - 2 tháng sau khi được chích liều vắc-xin Johnson & Johnson (J&J) duy nhất, hoặc
 - 5 tháng sau liều thứ 2 của vắc-xin Moderna hoặc Pfizer.Liều tăng cường có thể là bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào, tuy nhiên vắc-xin Pfizer hoặc Moderna được ưu tiên hơn. Trẻ em trong độ tuổi 12-17 chỉ được chích liều tăng cường bằng vắc-xin Pfizer.
- Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng, quý vị cần chích liều tăng cường sớm hơn. Xem trang thông tin của CDC về [Các loại Vắc-xin COVID-19 cho Người bị Suy giảm Miễn dịch ở Mức độ Trung bình hoặc Nặng](#) để tìm hiểu thêm.
- Nếu quý vị đã được chích các liều vắc-xin ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy xem trang thông tin của CDC về [Các loại Vắc-xin COVID-19 cho Những người được Chích ngừa Bên ngoài Hoa Kỳ](#) để biết khi nào quý vị hội đủ điều kiện để được chích liều tăng cường.

Những ai có thể được chích liều tăng cường thứ hai?

Những người sau đây hội đủ điều kiện để được chích liều tăng cường thứ hai cho vắc-xin COVID-19 *nếu đã qua ít nhất 4 tháng* tính từ khi họ được chích liều tăng cường đầu tiên của mình:

- Từ 50 tuổi trở lên
- Trong độ tuổi 18-49 và đã được chích cả liều chính và liều tăng cường bằng vắc-xin J&J
- Từ 12 tuổi trở lên và [bi suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng](#)

Hãy xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu quý vị có cần phải chích liều tăng cường thứ hai hay không.

Khi nào tôi cần chích liều tăng cường thứ hai?

Nếu quý vị thuộc một trong những nhóm có thể được chích liều tăng cường thứ hai, quý vị có thể chọn được chích ngừa ngay bây giờ hay chờ thêm một thời gian. Hãy cân nhắc hoàn cảnh của quý vị với những rủi ro và lợi ích. Bác sĩ có thể giúp đưa ra đánh giá về lựa chọn của quý vị. Tại thời điểm này, quý vị không cần phải chích liều tăng cường thứ hai để được coi là [đã chích ngừa cập nhật](#) các liều vắc-xin COVID-19 của mình.

Có một số yếu tố có thể khiến quý vị có khả năng bị bệnh rất nặng do COVID-19 cao hơn. Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được chích liều tăng cường thứ hai, việc chích liều này *ngay bây giờ* có thể giúp ích nếu quý vị (hay người mà quý vị sống cùng):

- Bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng



Vắc-xin COVID-19 - Câu Hỏi Thường Gặp

LIỀU TĂNG CƯỜNG

- [Có nhiều khả năng bị bệnh rất nặng do nhiễm COVID-19](#)
- Có nhiều khả năng bị phơi nhiễm COVID-19 do công việc của quý vị, nơi quý vị sinh sống hoặc do các yếu tố khác (như thường xuyên có chuyến đi hoặc tham gia vào các cuộc tụ họp đông người)
- Ở trong khu vực có mức lây truyền COVID-19 từ đáng kể đến cao
- Nếu người mà quý vị sống cùng chưa được chích ngừa

Quý vị có thể cân nhắc *chờ đợi thêm* trước khi chích liều tăng cường thứ hai nếu quý vị:

- Đã từng nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng gần đây
- Khỏe mạnh và ít tiếp xúc với người khác

Xem trang [Chích ngừa Liều tăng cường Thứ hai cho Vắc-xin COVID-19](#) của CDC để biết thêm thông tin. Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc.

Những rủi ro khi chích liều tăng cường là gì?

Các phản ứng sau khi được chích liều tăng cường cũng tương tự như đối với các liều chính. Hầu hết các tác dụng phụ đều ở mức nhẹ đến trung bình và kéo dài trong 2 ngày hoặc ngắn hơn. Giống với các liều chính, các phản ứng phụ nghiêm trọng là rất hiếm gặp. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang [Độ an toàn của Các loại Vắc-xin COVID-19](#) của CDC. Những lợi ích của việc chích liều tăng cường vượt xa so với những rủi ro đã biết và tiềm ẩn.

Tôi có cần phải xuất trình ghi chú hoặc đơn thuốc của bác sĩ để được chích liều tăng cường không?

Không, quý vị không cần phải có ghi chú hoặc đơn thuốc của bác sĩ để được chích liều tăng cường. Quý vị có thể tự chứng nhận (tự báo cáo) nếu hội đủ điều kiện. Khi quý vị đi đến địa điểm, hãy mang theo bằng chứng về việc đã được chích ngừa như thẻ chủng ngừa màu trắng do CDC cấp hoặc hồ sơ chủng ngừa điện tử của quý vị. Truy cập vào trang [Cách để được Chích ngừa](#) để biết thêm thông tin.

Tôi có thể biết thêm thông tin ở đâu?



- Để in hoặc xem tài liệu Câu hỏi thường gặp này hoặc Câu hỏi thường gặp về các chủ đề khác liên quan đến vắc-xin COVID-19, hãy quét mã QR hay truy cập trang [Câu hỏi thường gặp về vắc-xin COVID-19](#).
- Trang thông tin của CDC về [Các liều Tăng cường cho Vắc-xin COVID-19](#) của CDC
- Trang web [VaccinateLACounty.com](#) đăng tải [Lịch Chích ngừa COVID-19](#) có đi kèm sơ đồ minh họa cho biết thời điểm cần chích mỗi liều và thông tin về [Cách để được Chích ngừa](#).
- Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc.