



COVID-19 疫苗 – 常见问题 (FAQ)

适用于免疫功能受损者



为什么免疫系统薄弱者需要接种更多的剂量？

免疫系统中度或严重受损者（如患有与血液相关的癌症或正在接受相应的癌症治疗，接受了器官移植，患有某些自身免疫性疾病的个人）尤其容易受到 COVID-19 的侵害。他们比免疫系统正常者更容易感染 COVID-19。如果感染了 COVID-19，他们更有可能病得很重，并将病毒传播给其他人。

此外，一些免疫系统薄弱的个人在接种标准的 COVID-19 初始系列疫苗剂量后，不会获得足够的保护。正因如此，建议他们接种更多剂量的疫苗，并在更短的时间间隔内接种其中的一些剂量。

我应该接种多少剂疫苗？

如果你在 5 岁或以上，并且免疫系统中度或严重受损，你应该接种额外一剂 COVID-19 疫苗，来完成你的 初始系列疫苗的接种。这意味着总共：

- 接种三剂辉瑞或莫德纳疫苗 – 或 –
- 一剂强生疫苗，以及一剂辉瑞或莫德纳疫苗。

如果你在 12 岁或以上，并且你的免疫系统中度或严重受损，你还应该至少接种一剂加强剂。

- 如果你的初始系列疫苗接种的是辉瑞或莫德纳疫苗，你应该在接种第三剂疫苗的至少 3 个月后再接种一剂疫苗，总共 4 剂。
- 如果你的初始系列疫苗接种的是强生疫苗，而额外剂疫苗接种的是辉瑞或莫德纳疫苗，你应该在接种完辉瑞或莫德纳疫苗的至少 2 个月后再接种一剂疫苗，总共 3 剂。

如果你在 12 岁或以上，你可以选择在接种第一剂加强剂的至少 4 个月后再接种 第二剂加强剂 辉瑞或莫德纳疫苗，总共 5 剂。考虑尽快接种这剂加强剂疫苗。

向你的医生询问根据你目前的治疗计划，接种额外剂和/或加强剂疫苗的最佳时机。如果你即将开始或重新开始免疫抑制治疗，这一点尤为重要。

请参阅 [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinate.lacounty.gov) 上的 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，了解所有适用于免疫功能受损者的建议接种的初始和加强剂量疫苗（第 2 页）。

我还应该采取哪些措施来保护自己？

除了接种 COVID-19 疫苗外，采取其他措施保护自己免于感染 COVID-19 也很重要：

- **咨询你的医生，了解有关预防 COVID-19 的药物。**目前，一种名为 Evusheld 的药物可用于让仅靠接种疫苗而无法产生足够保护效果的个人免于感染 COVID-19。给药方式是一次进行两针臀部注射。它的适用对象包括 12 岁及以上且体重至少为 88 磅的个人。有关更多信息，请参阅网页：ph.lacounty.gov/covidmedicines。



COVID-19 疫苗 – 常见问题 (FAQ)

适用于免疫功能受损者

- 佩戴具有防护性的口罩，例如贴合面部的呼吸器（如 N95、KN95、KF94）或佩戴双层口罩，以加强防护效果。尽量避免前往人群拥挤的室内区域或空气流通不畅的地点。欲了解更多详情，请参阅 ph.lacounty.gov/reducerisk 和 ph.lacounty.gov/masks。
- 鼓励和你在一起的人帮助保护你的健康。他们应该满足最新的 COVID-19 疫苗接种要求，并且若符合条件，接种第二剂加强剂疫苗，以及采取其他措施，减少他们感染和传播 COVID-19 给你的风险。

我在哪里可以获得更多的信息？



- 如需打印或查看本常见问题或其他关于 COVID-19 疫苗主题的常见问题，请扫描二维码或访问 [COVID-19 疫苗常见问题\(FAQ\)](#)。
- [VaccinateLACounty.com](https://vaccinatelacounty.com) – 包括 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，其中有图表显示应接种每一剂疫苗的时间，以及[如何接种疫苗](#)的信息。
- 欲了解更多信息，请参阅美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的网页：“[适用于中度或重度免疫功能受损者的 COVID-19 疫苗](#)”。
- 如果你有任何问题，请咨询你的医生。