

# الجرعات الإضافية للذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي

(نقص المناعة)



الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 من الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي طبيعي، ومن المرجح أن يمرضوا بشكل أكثر خطورة إذا تمت إصابتهم بالمرض، وأن ينشروا الفيروس إلى الأشخاص الآخرين في منازلهم.

أظهرت الدراسات أن بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لا تنشأ لديهم حماية كافية بعد جرعتين من لقاح فايزر أو لقاح موديرنا. لهذا السبب، توصي "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) بأن يحصل الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد أو متوسط في الجهاز المناعي على جرعة إضافية من اللقاح. يشمل ذلك الأشخاص التي تكون حالتهم كالتالي:

- أثناء تلقي العلاج النشط للأورام السرطانية أو سرطان الدم
- بعد إجراء عملية زرع عضو، وأثناء تلقي أدوية تثبيط الجهاز المناعي
- بعد إجراء زرع للخلايا الجذعية في العامين الماضيين، أو أثناء تلقي أدوية تثبيط الجهاز المناعي
- نقص المناعة الأولية المتوسط أو الشديد (مثل متلازمة دي جورج، أو متلازمة ويسكوت ألدريتش)
- العدوى المتقدمة أو غير المعالجة لفيروس نقص المناعة البشرية
- أثناء العلاج بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، أو الأدوية الأخرى التي قد تثبط الاستجابة المناعية.



تحدث إلى طبيبك بشأن الحصول على جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19. إذا كنت بحاجة إلى جرعة ثالثة، فاسأل عن أفضل توقيت للجرعة بناءً على خطة علاجك الحالية. تزداد أهمية هذا الأمر إذا كنت على وشك بداية أو إعادة تلقي العلاج المثبط للمناعة.

يجب أن تعرف أيضًا:

- يجب إعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات "الحمض النووي الريبي المرسال" (mRNA) (مثل لقاحات فايزر وموديرنا) بعد 28 يومًا على الأقل من تلقي الجرعة الثانية.
- يجب استخدام نفس النوع من اللقاح إن أمكن. على سبيل المثال، إذا كنت قد حصلت على لقاحات فايزر، فحاول الحصول على لقاح فايزر لجرعتك الثالثة كذلك.
- لا يوصى حاليًا بتلقي جرعة لاحقة بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون. لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقيم البيانات حول فعالية هذا اللقاح في الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.



COUNTY OF LOS ANGELES  
**Public Health**

[VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com)

8/27/21 v2 (Arabic)