



## أهلية لقاح كوفيد-19

### الجرعات الأساسية، والإضافية، والمعززة للقاحات كوفيد-19 المعتمدة/ المرخصة من إدارة الغذاء والدواء<sup>1</sup>

جونسون آند جونسون	موديرنا <sup>3</sup>	فايرز <sup>2</sup> /كوميوناتي	
كل من يبلغ 18 عامًا أو أكبر	كل من يبلغ 18 عامًا أو أكبر	كل من يبلغ 5 أعوام أو أكبر <sup>1</sup>	العمر المؤهل
جرعة	جرعتان بينهما 28 يومًا	جرعتان بينهما 21 يومًا	الجرعات الأساسية
لا ينصح بها. انظر الجرعة المعززة أدناه.	من: يوصى بها إذا كان عمرك 12 عامًا أو أكبر وتعاني من <b>ضعف مناعي</b> معتدل أو شديد. متى: بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الثانية <sup>4,3</sup>		الجرعة الإضافية (الثالثة) <sup>4,3</sup>
من: يوصى بها <b>بشدة</b> لكل من كان لقاحه الأساسي جونسون آند جونسون.	من: يوصى به <b>بشدة</b> لكل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر. مهمة للغاية إذا كنت: • 65 عامًا أو أكبر. • 18 عامًا أو أكبر وتعاني من <b>مرض أساسي</b> أو مُعرَّض لخطر أكبر بسبب عدم المساواة الاجتماعية.		الجرعة المعززة <sup>3,5</sup> قد تكون الجرعة المعززة أي لقاح لفيروس كوفيد-19 (جونسون آند جونسون، أو فايزر، أو موديرنا)
يشمل هذا من يعانون من <b>ضعف مناعي</b> معتدل أو شديد.	متى: بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية <sup>6</sup> .		
متى: بعد شهرين على الأقل من جرعة جونسون آند جونسون.			

- 1 إذا تلقيت لقاحًا مدرجًا في قائمة منظمة الصحة العالمية أو لقاحًا ضمن تجربة سريرية للقاح كوفيد-19، يُرجى الاطلاع على الجدول الموجود على الصفحة التالية لمزيد من المعلومات عن الجرعة الإضافية والمعززة.
- 2 يحتوي لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على المكونات النشطة الموجودة في لقاح البالغين، إلا أن جرعته أصغر (1/3 الجرعة التي يتلقاها المراهقون والبالغون).
- 3 تتفاوت جرعات موديرنا. الجرعات الأساسية والجرعة الإضافية (الثالثة) جرعات كاملة بينما الجرعة المعززة نصف جرعة.
- 4 الجرعة الإضافية. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن **يتلقى من يعانون من ضعف مناعي معتدل إلى شديد** ومن كان لقاحهم الأساسي من نوع الحمض النووي الريبوزي المرسال (الرسالة) (فايزر أو موديرنا) جرعة إضافية (ثالثة) على أن تكون من لقاحهم الأساسي نفسه. استشر طبيبك بشأن حاجتك لتلقي جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 واستفسر عن أفضل توقيت بناءً على خطة علاجك الحالية. ملحوظة: إذا كنت تعاني من نقص مناعي وكان لقاح جونسون آند جونسون لقاحك الأساسي، يجب أن تحصل على جرعة معززة.
- 5 الجرعات المعززة. يمكنك اختيار لقاح الجرعة المعززة إما فايزر، أو موديرنا، أو جونسون آند جونسون. استشر طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول أخطار الجرعة المعززة وفوائدها أو نوع اللقاح الذي يجب أن تختاره.
- 6 إذا كنت تعاني من نقص مناعي، سيكون ذلك بعد 6 أشهر من جرعتك الإضافية (الثالثة).

لمزيد من المعلومات، راجع [كيفية تلقي اللقاح](#)، و[الجرعات لمنقوصي المناعة](#)، و[الجرعات المعززة](#).



# أهلية لقاح كوفيد-19

## الجرعات الإضافية والمعززة للمحصنين بالكامل<sup>1</sup> الذين تلقوا لقاحًا غير مرخص / معتمد من إدارة الغذاء والدواء في الجرعات الأساسية

لقاح نشط من تجربة سريرية للقاح كوفيد-19 <sup>3</sup>	لقاح كوفيد-19 مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية <sup>2</sup>	
		الجرعة الإضافية (الثالثة) <sup>4</sup>
		من: يوصى بها إذا كان عمرك 12 عامًا أو أكبر وتعاني من <b>ضعف مناعي</b> معتدل أو شديد.
		متى: بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الثانية
		الجرعة المعززة <sup>4</sup>
		من: يوصى به <b>بشدة</b> لكل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر.
		مهمة للغاية إذا كنت: • 65 عامًا أو أكبر. • 18 عامًا أو أكبر وتعاني من <b>مرض أساسي</b> أو مُعرَّض لخطر أكبر بسبب عدم المساواة الاجتماعية.
		متى: بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية <sup>5</sup> .

- 1 تعتبر محصنًا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي جرعتك النهائية من سلسلة اللقاحات. راجع صفحة الويب [عندما تكون محصنًا بالكامل](#) للمزيد من التفاصيل.
- 2 يشمل هذا أيضًا ما إذا كنت قد أكملت مزيج من الجرعات. يعني هذا مزيج من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة أو المرخصة من إدارة الغذاء والدواء أو المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية. اللقاحات الحالية غير المعتمدة / المرخصة من إدارة الغذاء والدواء المدرجة في [قائمة لقاحات منظمة الصحة العالمية](#) هي أسترازينيكا-أكسفورد (على سبيل المثال، كوفشيلد وفاكسزيفريا)، وسينوفارم، وسينوفاك، وكفاكسين. انظر إلى قسم [متى أكون محصنًا بالكامل](#)؟ في صفحة ويب [عندما تكون محصنًا بالكامل](#) لمعرفة المزيد.
- 3 إذا كنت قد شاركت في تجربة اللقاح السريرية أسترازينيكا أو نوفافاكس وحصلت على لقاح كوفيد-19 "النشط" (وليس الدواء الوهمي).
- 4 لقاح فايزر كوفيد-19 هو اللقاح الوحيد المصرح به جرعة إضافية أو معززة لمن لم يتلقوا جرعات لقاح مرخصة / معتمدة من إدارة الغذاء والدواء.
- 5 إذا كنت تعاني من نقص مناعي، سيكون ذلك بعد 6 أشهر من جرعتك الإضافية (الثالثة).

لمزيد من المعلومات، راجع [كيفية تلقي اللقاح](#)، و [الجرعات لمنقوصي المناعة](#)، و [الجرعات المعززة](#).