



# ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19



## ทำไมต้องได้รับการฉีดวัคซีน

- วัคซีนโควิด-19 **มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ**
- การได้รับวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ
- วัคซีนช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ขาดงานหรือขาดเรียน รวมถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต



ฟรี

## ใครสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้บ้าง

### ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป

- ฉีดวัคซีนให้ **ฟรี** สำหรับทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่มีความเสี่ยงสุขภาพก็ตาม
- คุณมีสิทธิได้รับวัคซีน และจะไม่มีคำถามถึงสถานะการณ้เข้าเมืองของคุณ
- ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่กำลังให้นมบุตร และผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19
- ผู้ที่เป็นภูมิแพ้สามารถรับวัคซีนได้

## วิธีการเข้ารับการฉีดวัคซีน

มีสถานที่ที่กว้างขวางทั่วมุมซอลลอสแอนเจลิสส่วนมากเปิดช่วงวันหยุดและช่วงเย็น ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ค้นหสถานที่ใกล้บ้านของคุณ:

- ไปที่ **VaccinateLACounty.com** หรือโทรหาศูนย์รับเรื่องวัคซีน (Vaccine Call Center) ที่หมายเลข **833-540-0473** ศูนย์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.30 น.
  - นอกจากนี้คุณยังสามารถโทร 2-1-1 หรือเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้าน
  - บริการรถขนส่งฟรีเพื่อนำคุณไปยังศูนย์ฉีดวัคซีน
- เยาวชนจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

## วัคซีนใดบ้างที่พร้อมให้บริการ

**Pfizer และ Moderna สามารถใช้เพื่อฉีดสำหรับวัคซีนเข็มแรก, วัคซีนเข็มเสริม, และวัคซีนเข็มกระตุ้น**

	Pfizer	Moderna	Johnson & Johnson
สำหรับ:	ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป	ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป	ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
วัคซีนชุดแรก:	2 โดส – ห่างกัน 3-8 สัปดาห์	2 โดส - ห่างกัน 4-8 สัปดาห์	1 โดส
วัคซีนเข็มกระตุ้น:	อายุ 12 ปีขึ้นไป หลังจาก 5 เดือน	อายุ 18 ปีขึ้นไป หลังจาก 5 เดือน	อายุ 18 ปีขึ้นไป หลังจาก 2 เดือน

**ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง** - อายุ 5-11 ปี: วัคซีนเข็มเสริม, อายุ 12 ปีขึ้นไป: วัคซีนเข็มเสริมและวัคซีนเข็มกระตุ้น ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะแตกต่างกันออกไปตามวัคซีนชุดแรก



# ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

## ผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง

- ผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ อาการปวดหรือแดงที่แขน รู้สึกเหนื่อย มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ หรือปวดกล้ามเนื้อ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการเช่นนี้
- ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณ **กำลังสร้างการปกป้องร่างกาย** โดยอาการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันของคุณ แต่อาการควรหายเองภายใน 1 หรือ 2 วันหลังรับวัคซีน
- ผลข้างเคียงที่รุนแรงเกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อย และส่วนใหญ่สามารถรักษาได้



## วัคซีนปลอดภัยเพียงใด

- คุณจะไม่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากวัคซีน ไม่มีวัคซีนใดมีไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19
- วัคซีนผ่านการทดสอบในผู้คนหลายหมื่นคน ซึ่งรวมถึงคนผิวสี ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอาการป่วยต่างๆ และเราพบว่าวัคซีน**ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ**
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 **ผู้คนหลายร้อยล้านคน** ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างปลอดภัย
- วัคซีนโควิด-19 **ได้รับการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มข้น** ขณะนี้ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- ไม่มีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะเป็นหมัน วัคซีนเหล่านี้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์และได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์



## หลังฉีดวัคซีน

- จะถือว่าคุณได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วภายใน 2 สัปดาห์ของการฉีดวัคซีนชุดหลัก เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด คุณควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์) เมื่อคุณสามารถฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ได้
- วัคซีนช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมาก แต่การติดเชื้อรอบใหม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ให้ยังคงดำเนินตามมาตรการเพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่นอยู่:
  - **สวมใส่หน้ากากที่มีคุณภาพและพอดีกับใบหน้าของคุณ**
  - เมื่อป่วยให้อยู่บ้าน
  - ล้างมือบ่อยๆ
  - หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดและมีอากาศไหลเวียนต่ำ
  - รักษาระยะห่าง

