



COVID-19 疫苗的事實



為什麼要接種疫苗？

- COVID-19 疫苗**安全而且有效**。
- 接種疫苗是保護你和你的親人免於生病、缺勤、住院或死亡的最好方法。
- 疫苗可抵禦COVID-19的Delta病毒變異株。它們也會降低出現新的甚至更危險的病毒變異株的機率。

誰可以接種疫苗？

12歲及以上的個人

- 每個人均可以**免費**接種疫苗，即使你沒有健康保險。
- 你不會被問及關於移民身份的問題。
- 建議所有12歲及以上的個人接種疫苗，包括孕婦或哺乳婦女，以及已經患過COVID-19的個人。
- 大多數有過敏症者都可以接種疫苗。



如何接種疫苗

在整個洛杉磯縣有數百個疫苗接種點——許多會在週末和晚上開放，且無需預約。

在你附近找到一處疫苗接種點：

- 請訪問**VaccinateLACounty.com**；或致電**833-540-0473**，服務時間為：每天早上8點至晚上8點半。
- 你也可以致電全天候熱線2-1-1，它可以提供多種語言的資訊，或者你也可以諮詢你的醫生或當地藥劑師。
- 可提供免費交通工具和居家接種疫苗服務。

未成年人需要父母或法定監護人的同意才能接種疫苗。



在美國有哪些可供接種的疫苗？


輝瑞公司

適用群體：12歲及以上年齡的個人
 接種劑量：2劑 – 中間間隔21天




莫德納公司

18歲及以上年齡的個人
 2劑 – 中間間隔28天



強生公司

18歲及以上年齡的個人
 1劑



如果你有中度或重度削弱的免疫系統，你可能需要接種額外的疫苗劑量——請諮詢你的醫生。



COVID-19 疫苗的事實

疫苗有哪些副作用？

- 接種疫苗後出現副作用是很常見的，這些副作用可能包括：手臂酸痛或紅腫、感到疲倦、發燒、發冷、頭痛或肌肉酸痛。它們並不意味著你感染了COVID-19。不是每個人都會出現副作用。
- 出現副作用表明你的免疫系統正在**建立保護作用**。副作用可能會影響你進行一些日常活動的能力，但它們應該會在接種疫苗後的一兩天內消失。
- 嚴重的副作用非常罕見，而且大多數是可以治療的。



疫苗的安全性如何？

- 接種疫苗不會讓你感染COVID-19。沒有一種批准使用的疫苗含有導致COVID-19的病毒。
- 這些疫苗已在數萬人身上進行了測試，其中包括有色人種、老年人和有健康問題的個人，測試結果發現疫苗是安全的。
- 確保疫苗的**安全有效性**所需的每一個步驟都得到了遵守。
- 自2020年12月以來，已有**數以千萬計的人安全**接種了COVID-19疫苗。
- 沒有證據表明接種COVID-19疫苗會導致男性和女性出現生育問題。我們所掌握的關於懷孕的所有資訊都令人放心。科學家們將繼續仔細研究COVID-19疫苗的副作用，並分享他們的最新研究成果。

接種疫苗之後

- 在你接種強生疫苗，或輝瑞/莫德納疫苗的第二劑的兩週之後，你才算**已全劑量接種疫苗**。你的身體需要時間來建立免疫力。
- 在你全劑量接種疫苗後，請繼續採取措施，保護自己和他人：
 - **佩戴貼合面部的口罩**
 - 生病時留在家中
 - 勤洗手
 - 避開人群擁擠的地點和空氣流通不暢的場所
 - 與他人保持距離

