



لقاحات كوفيد-19: فايزر وموديرنا توقيت الجرعة الثانية

متى يجب أن أحصل على الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو موديرنا؟
إذا تلقيت لقاح فايزر أو موديرنا ضد كوفيد-19، فستحتاج إلى جرعتين أساسيتين. يعتمد توقيت جرعتك الثانية على حالتك.




إذا كان عمرك يتراوح بين 12 و64 عامًا:

- قد تستفيد من تلقي جرعتك الثانية بعد 8 أسابيع من الجرعة الأولى لأن قضاء وقت أطول بين الجرعتين الأولى والثانية يبدو أنه يحسن فعالية اللقاحات ويقلل أخطار الإصابة بالتهاب عضلة القلب النادرة بالفعل. الذكور الأصغر سنًا (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 عامًا) هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب.
- إذا كنت بحاجة إلى أن تكون محصنًا بالكامل في وقت أقرب، يجب أن تتلقى الجرعة الثانية مبكرًا: 3 أسابيع على الأقل بعد الجرعة الأولى من فايزر وما لا يقل عن 4 أسابيع بعد الجرعة الأولى من موديرنا. ومن الأمثلة على ذلك وجود انتشار كبير في المجتمع حيث تعيش أو تعمل أو تسافر؛ إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بمرض خطير، أو إذا كنت بحاجة للقاح للسفر، أو العمل، أو المدرسة.
- استشر طبيبك إذا لم تكن متأكدًا من التوقيت الأفضل لحالتك.

إذا كنت أياً من الفئات التالية:

- نقص المناعة المعتدل أو الشديد،
- عمرك 65 سنة وأكبر، أو
- عمرك 5-11 سنة.



يجب أن تتلقى جرعتك الثانية مبكرًا - على الأقل 3 أسابيع بعد الجرعة الأولى من فايزر وما لا يقل عن 4 أسابيع بعد الجرعة الأولى من موديرنا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة ويب [كيف أتلقى التطعيم](#).