



چه زمانی باید دوز دوم MODERNA یا PFIZER خود را دریافت کنیم؟




در صورت دریافت واکسن کووید-19 Pfizer یا Moderna، برای تکمیل سری اولیه به 2 دوز نیاز خواهید داشت. زمان بندی دوز دوم شما به وضعیت فردی شما بستگی دارد.

اگر سنتان 12-64 سال است:

- دریافت دوز دوم 8 هفته پس از دوز اول، ممکن است برایتان سودمند باشد. دلیل این امر آن است که به نظر می‌رسد وجود زمان طولانی‌تر بین دوز اول و دوم کارایی واکسن‌ها را بهبود می‌بخشد. به علاوه، این کار خطر نادر ابتلا به میوکاردیت را نیز کاهش می‌دهد. جوانان مذکر (12-39 سال) در معرض بیشترین خطر ابتلا به میوکاردیت قرار دارند.
- اگر لازم است زودتر کاملاً واکسینه شوید، باید دوز دوم خود را پیش از موعد دریافت کنید: حداقل 3 هفته بعد از دوز اول Pfizer خود و حداقل 4 هفته بعد از دوز اول Moderna خود. نمونه‌های این مورد در صورتی است که انتشار همگانی وسیعی در محلی که زندگی می‌کنید، کار می‌کنید یا مسافرت می‌کنید وجود داشته باشد؛ اگر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید قرار دارید، یا اگر برای سفر، کار، یا مدرسه به آن نیاز دارید.
- اگر مطمئن نیستید که کدام زمان بندی برای وضعیت شما مناسب‌ترین است، با پزشکتان صحبت کنید.

اگر هر یک از موارد زیر در موردتان صدق می‌کند:

- نقص ایمنی متوسط یا شدید
- 65 سال به بالا
- 5 تا 11 سال



شما باید دوز دوم خود را پیش از موعد دریافت کنید- حداقل 3 هفته بعد از دوز اول Pfizer خود و حداقل 4 هفته بعد از دوز اول Moderna خود

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه وب [چگونه واکسینه شویم](#) مراجعه نمایید .