



COVID-19 疫苗：辉瑞和莫德纳

接种第二剂疫苗的时机

我应该什么时候接种第二剂辉瑞或莫德纳疫苗？

如果你已接种辉瑞或莫德纳的 COVID-19 疫苗，你需要接种 2 剂才能完成初始剂量的接种流程。第二剂疫苗的接种时间取决于你的个人情况。




如果你的年龄在 12-64 岁之间：

- 在接种第一剂疫苗的 8 周后再接种第二剂疫苗可能对你更有好处。这是因为若接种第一剂疫苗和第二剂疫苗的间隔时间较长，则更可能提高疫苗的效力。此外，这种做法还降低了本已罕见的心肌炎感染风险。年轻男性（12-39 岁）患心肌炎的风险最高。
- 如果你需要尽快完成全剂量疫苗的接种，你应该更早地接种第二剂疫苗：即至少在接种第一剂辉瑞疫苗的 3 周后，或至少在接种完第一剂莫德纳疫苗的 4 周后。需要的实例包括，如果你在你生活、工作或旅行的地点有很高的社区病毒传播率；如果你罹患严重疾病的风险更高，或者如果你因旅行、工作或上学而需要尽早全剂量接种疫苗。
- 如果你不确定哪个接种时机最适合你个人的情况，请咨询你的医生。

如果你满足以下任一条件：

- 免疫功能中度或严重受损
- 65 岁及以上
- 5 - 11 岁

你应该更早地接种第二剂疫苗——即至少在你接种第一剂辉瑞疫苗的 3 周后，或至少在你接种第一剂莫德纳疫苗的 4 周后



欲了解更多信息，请参阅[如何接种疫苗](#)网页。