




Vacunas contra el COVID-19: Pfizer y Moderna

PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS



¿CUÁNDO DEBERÍA RECIBIR MI SEGUNDA DOSIS DE PFIZER O MODERNA?

Si recibe una vacuna contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna, necesitará 2 dosis para completar la serie primaria. La programación de su segunda dosis depende de su situación individual.




Si tiene entre 12 y 64 años:

- **Puede beneficiarse de recibir su segunda dosis 8 semanas después de su primera dosis.** Esto se debe a que pasar más tiempo entre la primera y la segunda dosis parece mejorar la eficacia de las vacunas. Además, también reduce el raro riesgo de miocarditis. Los hombres más jóvenes (de 12 a 39 años) tienen el mayor riesgo de contraer miocarditis.
- **Si necesita estar completamente vacunado lo más antes posible,** debería recibir su segunda dosis antes: al menos 3 semanas después de su primera dosis de Pfizer y al menos 4 semanas después de su primera dosis de Moderna. Ejemplos de esto son si hay mucha propagación en la comunidad donde vive, trabaja o viaja; si tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave o si lo necesita para viajar, trabajar o estudiar.
- Hable con su médico si no está seguro de cuál es el mejor momento para su situación.

Si usted es alguno de los siguientes:

- Moderado o severamente inmunocomprometido
- Mayor de 65 años
- De 5 a 11 años

Debería recibir su segunda dosis antes - al menos 3 semanas después de su primera dosis de Pfizer y al menos 4 semanas después de su primera dosis de Moderna



Para obtener más información, consulte la página web de [Cómo vacunarse](#).