



COVID-19 疫苗：輝瑞和莫德納

接種第二劑疫苗的時間

我應該什麼時候接種第二劑輝瑞或莫德納疫苗？

如果你已接種輝瑞或莫德納的 COVID-19 疫苗，你需要接種 2 劑才能完成初始劑量的接種流程。第二劑疫苗的接種時間取決於你的個人情況。




如果你的年齡在 12-64 歲之間：

- 在接種第一劑疫苗的 8 週後再接種第二劑疫苗可能對你更有好處。這是因為若接種第一劑疫苗和第二劑疫苗の間隔時間較長，則更可能提高疫苗的效力。此外，這種做法還降低了本已罕見的心肌炎感染風險。年輕男性（12-39 歲）患心肌炎的風險最高。
- 如果你需要儘快完成全劑量疫苗的接種，你應該更早地接種第二劑疫苗：即至少在接種第一劑輝瑞疫苗的 3 週後，或至少在接種完第一劑莫德納疫苗的 4 週後。需要的實例包括，如果你生活、工作或旅行的地點有很高的社區病毒傳播率；如果你罹患嚴重疾病的風險更高，或者如果你因旅行、工作或上學而需要儘早全劑量接種疫苗。
- 如果你不確定哪個接種時機最適合你個人的情況，請諮詢你的醫生。

如果你滿足以下任一條件：

- 免疫功能中度或嚴重受損
- 65 歲及以上
- 5 - 11 歲

你應該更早地接種第二劑疫苗——即至少在你接種第一劑輝瑞疫苗的 3 週後，或至少在你接種第一劑莫德納疫苗的 4 週後



欲瞭解更多資訊，請參閱[如何接種疫苗](#)網頁。