

BROTOS DE INFLUENZA CANINA H3N2 Y LEPTOSPIROSIS EN PERROS EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES

Brote de influenza canina H3N2 (CIV H3N2)

- De julio a octubre de 2021, se han notificado más de 1,000 casos confirmados y sospechosos 2 en el condado de Los Ángeles y 5 perros han muerto a causa de la enfermedad.
- Este brote se está extendiendo rápidamente por todo el condado de LA y afecta a muchas perreras privadas y guarderías de perros. Algunas perros se han infectado en parques para perros y en otros lugares donde se acercan a otros perros.
- Los síntomas en los perros incluyen: tos, fiebre, estornudos, secreción nasal, letargo y pérdida de apetito. Es posible que se produzca una neumonía grave o mortal. Algunos infectados no tienen síntomas.
- Los perros pueden infectarse por contacto directo con otros perros infectados, al toser o estornudar, o por contacto con objetos contaminados (juguetes, comederos y bebederos, zapatos, etc.).
- Su veterinario puede realizar pruebas para detectar el virus.
- Los perros con CIV H3N2 pueden contagiar a otros perros durante varias semanas después de la recuperación.



Proteja a su mascota y ayude a detener la propagación de estas enfermedades:


- Vacunar a los perros tanto contra el CIV H3N2 y Lepto, especialmente antes de entrar en una perrera o guardería o antes de entrar en contacto con otros perros.
- Mantenga a los perros enfermos o infectados en casa:
- Para CIV H3N2: mantenga a los perros enfermos en casa durante 28 días a partir del primer día de la enfermedad.
- Para Lepto: mantenga a los perros infectados en casa hasta que termine la medicación.

Brote de leptospirosis canina (Lepto)

- De julio a octubre de 2021, se han reportado 150 casos confirmados y 16 sospechosos de Lepto y 6 perros han muerto a causa de la enfermedad.
- La mayoría de los casos ocurrieron en lugares donde se reúnen los perros (perreras privadas, guarderías, parques para perros). Algunos se infectaron durante caminatas en su vecindario.
- Los síntomas incluyen falta de energía, pérdida de apetito, orinar en exceso, beber en exceso y vómitos. Algunos infectados no tienen síntomas. Varios casos progresan a daño renal o hepático severo y requieren hospitalización.
- Los perros pueden infectarse con Lepto cuando tienen contacto con la bacteria, ya sea en el suelo, en el agua o en la orina de perros o animales salvajes infectados.
- Su veterinario puede realizar pruebas para detectar la bacteria.
- Las personas pueden contraer leptospirosis, y tener fiebre, dolor de cabeza y en los músculos. Puede afectar los riñones y volverse grave. Una persona se infecta por exposición a la orina de un animal infectado, así que use guantes cuando limpie los desechos. Hable con su médico si tiene alguna pregunta sobre su propia salud.

For more information:

<http://publichealth.lacounty.gov/vet>



11/2/2021